

ରୋଗ	ପ୍ରତିରୋଧୀ ବା ସହଣଶୀଳ କିସମ
ମହିଷା ରୋଗ	ହୀରା, ପାରିଜାତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି, ମହାନଦୀ, ଉଦୟଗିରି ଇତ୍ୟାଦି
ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ	ଗାୟତ୍ରୀ, ସାମନ୍ତ, କୋଣାର୍କ, ଜଗନ୍ନାଥ, ପଥରା ଇତ୍ୟାଦି
ପତ୍ରଛାଦପୋଡ଼ା ରୋଗ	ଶ୍ରୀବତୀ, ଲଲାଟ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉର୍ବଶୀ ଇତ୍ୟାଦି
ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ	ପାରିଜାତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଉଦୟଗିରି, ପ୍ରାଚୀ ଇତ୍ୟାଦି

ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ରୋଗର ନାମ	ସିଞ୍ଚନ ବିଷର ନାମ	ମାତ୍ରା (ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ)
ମହିଷା ରୋଗ	ଗ୍ରାଜସାଇକ୍ଲୋଲ୍ / ଇପ୍ରୋବେନୋଫସ୍ / କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ -	୧ ଗ୍ରାମ / ୧ ମି.ଲି / ୨ ଗ୍ରାମ
ପତ୍ରଛାଦ ପୋଡ଼ାରୋଗ	ଭାଲିଡା ମାଇସିନ / ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ୍	୧.୫ ମି.ଲି / ୧.୫ ମି.ଲି
ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ	ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ୍ / କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ + ମାନ୍‌କୋଜେବ୍ -	୧.୫ ମି.ଲି / ୨ ଗ୍ରାମ
ବାଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ	କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ + ଷ୍ଟେପ୍ଟୋ ସାଇକ୍ଲିନ୍ -	୨ ଗ୍ରାମ + ୦.୧ ଗ୍ରାମ
ପତ୍ରଛାଦ ସଜାରୋଗ	ପ୍ରପି କୋନା ଜୋଲ୍ -	୧.୫ ମି.ଲି
ମୂଳସଜା ରୋଗ	ବେନୋମିଲ୍ / କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ + ମାନ୍‌କୋଜେବ୍ -	୨ ଗ୍ରାମ / ୨ ଗ୍ରାମ
ସାଆରା ଓ ଅଗରବତୀ ରୋଗ	କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ -	୨ ଗ୍ରାମ (କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ)
ଚୁଙ୍ଗୋଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ	ଏସିଫେବ୍ -	୨.୫ ଗ୍ରାମ (ସବୁଜ ପତ୍ରଟିଆଁ କାଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ)

ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁତ୍ର ଜୀବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ବିଷ ଔଷଧ	ମୂଳକାରେ ପ୍ରୟୋଗ	ସି ନ
କାର୍ବୋସଲଫାନ	-	୨ ରୁ ୩ ମି.ଲି / ଲିଟର
କାରୋଫ୍‌ହାଇଡ୍ରୋ	-	-
କ୍ଲୋରାଇଡ୍	୧୭.୫ କେଜି / ହେକ୍ଟର	୧.୨୫ ଗ୍ରାମ / ଲିଟର
କାର୍ବୋଥୁରାନ୍	୩୦ କେଜି / ହେକ୍ଟର	-
ଫୋରେବ୍	୧୦ କେଜି / ହେକ୍ଟର	-

ଦେଶୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

* ଧାନର ମହିଷା ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ କିମ୍ବା ବେଲ ପତ୍ର ନଖ ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ସିଝାଇ ଛାଣି ଆଉ ୯ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସି ନ କରନ୍ତୁ ।

* ଧାନର ବାଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କେ.ଜି ସବ୍ୟ ଗୋବର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଗାଈ ଗୋବର	-	୧ ଭାଗ
ଗୋ ମୁତ୍ର	-	୧ ଭାଗ
ପାଉଁଶ	-	୧ ଭାଗ
ହୁଙ୍କା ବା ପଚୁମାଟି	-	୧ ଭାଗ
ନିମ୍ବ ବା କରଞ୍ଜିବଟା	-	୧.୫ ଭାଗ
ରସୁଣ କିମ୍ବା ହଳଦୀ	-	୨ ଚାମଚ

ଏହି ଦ୍ରବଣ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଧାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ କମିଥାଏ ।



ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ
 କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ-୧, ଭଞ୍ଜନଗର, ବେଶାକୁୟା
 ପୋ: ଡିହପଡ଼ାଳ, ଭଞ୍ଜନଗର-୭୬୧୧୪୦

ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଓ ତାହାର ପରିଚ୍ଛେଦନ



ବିଷୟବସ୍ତୁ :

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂହ

ସଂପାଦନା :

ଡଃ. ସୁତନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର



ଗଞ୍ଜାମ-୧, ଭଞ୍ଜନଗର, ବେଶାକୁୟା, ପୋ: ଡିହପଡ଼ାଳ,
 ଭଞ୍ଜନଗର, ପିନ୍ : ୭୬୧୧୪୦
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୩

ଧାନ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-ମହିଷା ରୋଗ, ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ, ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ଆଛଦପୋଡ଼ା ରୋଗ, ପତ୍ରାଛାଦସଜାରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୌଣ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-ସାହାରା ରୋଗ, ଅଗରବତି ରୋଗ, ଟୁଙ୍ଗୋ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ମୂଳ ସଜାରୋଗ, ସୂତ୍ରଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହାଯୋଗୁଁ ଅମଳ ୧୫ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ମହିଷା ରୋଗ :

ମହିଷା ରୋଗ ପତ୍ର, ଗଣ୍ଡି ଓ ଗଳାରେ ଦେଖାଯାଏ । ପତ୍ର ମହିଷାରେ ପତ୍ର ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଆଖି ସଦୃଶ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଦାଗର ଋରିପାଖ ଧୂସର ଓ ମଝି ଅଂଶ ପାଉଁଶିଆ ହୋଇଥାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ପୋଡ଼ାଳିଆ ଦେଖାଯାଏ । ଗଣ୍ଡି ମହିଷାରେ ଗଣ୍ଡିଜାଗା କଳା ଦେଖାଯାଏ ଓ ଗଣ୍ଡିରୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ରଳା ମହିଷାରେ କେଣ୍ଡାର ତଳ ଅଂଶ କଳା ପଡେ କେଣ୍ଡାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ।

ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ :

ଏହି ରୋଗରେ ଧାନପତ୍ର ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ଦାଗମାନ ଦେଖାଯାଏ । ଦାଗର ମଧ୍ୟଭାଗ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଓ ଋରିପାଖ ବାଦାମୀ ହୋଇଥାଏ । ପତ୍ର ଆଛାଦ ଓ ଧାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଓ ପରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଓ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।

ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ :

ଏହି ରୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଓ ଧାରରେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଓ ପରେ ଏହା ପତ୍ରର ତଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଥାଏ । କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କେଣ୍ଡା ଶୁଖି ଅଗାଧି ହୋଇଯାଏ । ତଳି କିଆରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପତ୍ର ଶୁଖି ଝାଉଁଳି ଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ରେସେକ୍ କୁହାଯାଏ ।

ଆଛଦପୋଡ଼ା ରୋଗ :

ଏହି ରୋଗରେ ତଳପତ୍ରର ଆଛଦପତ୍ରରେ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ଲମ୍ବାଳିଆ ଅଣ୍ଡାକାର ପାଣିପରୁ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଦାଗର

କେନ୍ଦ୍ରାଂଶ ଧୂସର ଓ ଋରିପାଖ ଗାଢ଼ବାଦାମୀ ଦେଖାଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୋରିଷ ମାଞ୍ଜି ପରି କବକ କୃଷ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଧାନ ଅଗାଧି ହୋଇଯାଏ ।

ସାହାରା ରୋଗ :

କେଣ୍ଡାର ଦାନା ପାଟିବା ବେଳକୁ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ କେଣ୍ଡାର କେତେକ ଧାନର ଚୋପା ଫୁଲିଯାଇ ସେଥିରେ ନୀଳ ବା କଳା ରଙ୍ଗର କବକ ପିଣ୍ଡୁଳା ଥାଏ ।

ଅଗରବତି ରୋଗ :

ଏହି କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଧାନ ଥୋଡ଼ ହେବା ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ କେଣ୍ଡାଟି ପତ୍ର ଆଛଦମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ କବକରୁ ନିର୍ଗତ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଧାନନାଡ଼ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ଧୂପକାଠି ପରି ଦେଖାଯାଏ ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କେଣ୍ଡାରେ ଆଦୌ ଧାନ ହୁଏନାହିଁ ।

ଟୁଙ୍ଗୋ ଭୂତାଣୁ ରୋଗ :

ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ ଗଛ ବାଙ୍ଗରା ହୋଇ କମ୍ ପିଲ ଦିଏ । ତଳ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦୀ ମିଶା ନାରଙ୍ଗୀ ହେବା ସହ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ତଳକୁ ଝୁଲିପଡେ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର କେଣ୍ଡା ଛୋଟ, ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ । ସବୁଜ ପତ୍ର ଡିଆଁ କୀଟ ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

ମୂଳ ସଜାରୋଗ :

ଏହା କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ତଳି ଘରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ହଳଦିଆ ପତି ମରିଯାଏ । ରୋଇବା ପରେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ସରୁ ଓ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ମୂଳ ସଜିଯାଏ ଏବଂ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ କଳା ଦେଖାଯାଏ ।

ପତ୍ରାଛାଦସଜାରୋଗ :

କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥୋଡ଼ ପତ୍ରରେ ଅନିୟମିତ ଧୂସରମିଶା ବାଦାମୀ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ କେଣ୍ଡା ଭଲଭାବରେ ବାହାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସଜିଯାଏ । ଧଳା କବକଗୁଣ୍ଡ ପତ୍ରାଛାଦମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସୂତ୍ରଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ :

ଧବଳପତ୍ର ଶୁଖା ରୋଗ

ସୂତ୍ରଜୀବ ପତ୍ର ଓ ପତ୍ରାଛାଦକନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଗଛର କ୍ଷତି କରେ । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରର ଅଗ ଆଡୁ ଧଳା କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ସୂତାଖିଅ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରେ ନାହିଁ ଓ ଧାନ ଅଗାଧି ହୋଇଥାଏ

କେଣ୍ଡା ମୋଡ଼ାରୋଗ :

ସୂତ୍ରଜୀବ କଅଁଳିଆ ଫିଟି ନଥିବା କେଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧଳାଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଓ ପରେ ପତ୍ର ଓ କେଣ୍ଡା ଲୋଚାକୁରୁ ହୋଇଯାଏ । ଧାନ ଅଗାଧି ହୋଇଯାଏ ।

ଚେର ଗଣ୍ଡିରୋଗ :

ସୂତ୍ରଜୀବ ଚେରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନାରଙ୍ଗୀ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ଚେରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଏ । ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ଦିଶେ ଓ କେଣ୍ଡାରେ ଦାନା କମ୍ ହୁଏ ।

ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

ଚାଷ ପଦ୍ଧତି :

*ଗଭୀର ଖରାଟିଆ ଋଷ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାଟିରେ ଥିବା କବକ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

*କବକ ନାଶକ-କାର୍ବାଣ୍ଡାଜିମ୍ -୧.୫ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜେଲ୍ -୧ ଗ୍ରାମ୍ /କେଜି ବିହନ ପିଛା ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାନ୍ତୁ ।

*ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ଓ ସାର ପରିଚ୍ଛଳନା କଲେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଥାଏ ।

*ସଠିକ୍ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ରୋଗର ଜୀବନ ଚକ୍ର ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ।

*ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିରୋଧୀ / ସହଣୀଶକ୍ତି ଥିବା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଥାଏ ।