

ଶାହାଣ (Hemorrhagic septicemia)

ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଛେଳିକୁ ଜ୍ୱର ଓ କାଶ ହୁଏ । ଗଳା ଫୁଲିଯାଏ । ପାଟିରୁ ଅନବରତ ଲାଳ ବାହାରେ । ତେଣୁ ବର୍ଷାରତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଶାହାଣ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେଲେ ଭଲ ।

ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ: (Viral Diseases)

ଫାଟୁଆ (Foot and Mouth Disease)

ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପାଟି ଓ ଖୁରାରେ ଫୋଟକା ହେବା, ଦୁଇ ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୋଟକାଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଘା' ହୋଇଯାଏ । ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହେ । ଏହି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛେଳିକୁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ପି.ପି.ଆର. (Peste Des Petits Ruminants)

ଏହି ରୋଗ ସବୁ ବୟସର ଛେଳିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଭୂତାଣୁ ଛେଳିର ନାକ ଓ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣି, ମଳ ଓ ମୂତ୍ର ଆଦିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ । କାଶ ଓ ଜ୍ୱର ହୋଇ ମୁହଁ ଭିତରେ ଘା' ହୁଏ । ଏହି ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ପି.ପି.ଆର. ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଥରେ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହା ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ । ଆିବାୟୋଟିକ୍ ଯଥା ସିପ୍ରୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍, ଏନରୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍, କ୍ଲବ୍‌ସିଲିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସଂକ୍ରମିତ ଛେଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଯାଇପାରେ ।

କୃମିଜନିତ ରୋଗ (Parasitic Diseases)

ଅନ୍ତଃକୃମି (Endoparasites)

ଗୋଲ କୃମି, ଫିତାକୃମି, ରକ୍ତଶୋଷଣକାରୀ କୃମିମାନ ଶରୀରରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି । ବର୍ଷକୁ ତିନିରୁ ଚାରିଥର କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେଇ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃକୃମିରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।

ବାହ୍ୟକୃମି (Ectoparasites)

ଟିକ୍ସ ଓ ଉକୁଣୀ ଦେହରେ ଲାଗିରହି ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି ଓ ତଦ୍ୱାରା ଛେଳିର ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହୁଏ । ପାଣିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଛେଳିକୁ ସେହି ପାଣିରେ ବୁଡାଇ କୃମି ନାଶକ କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଯେପରି ପାଣିରେ ବୁଡିବ ନାହିଁ ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ

ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୧,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ଏଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭ ନିୟୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମା ଲରେ ଛେଳି ଚାଷ ଏକ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।



ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ-୧, ଭଞ୍ଜନଗର, ବେଣାକୁୟା
ଫୋ: ୦୬୭୧୧୪୦

ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ପାଳନ



ବିଷୟବସ୍ତୁ :

ଡଃ. ଶ୍ରୀମତୀ ସୁତିରେଖା ମଲ୍ଲିକ
ସଂପାଦନା

ଡଃ. ସୁତନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର



ଗଞ୍ଜାମ-୧, ଭଞ୍ଜନଗର, ବେଣାକୁୟା, ଫୋ: ୦୬୭୧୧୪୦
ଭଞ୍ଜନଗର, ପିନ୍ : ୭୬୧୧୪୦
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୩

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ ଅନିୟମିତତା ଋଷୀକୁଳପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଋଷ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ଚଳେଇବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ପଶୁପାଳନକୁ ଏକ ପେଷା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଷୀକୁଳ ବାଧ୍ୟ । ଜମିହୀନ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପଜମି ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପଶୁପାଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପେଷା କରି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ । ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଗାଈ, ମଇଁଷି ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଛେଳି ପାଳନ ପାଇଁ କମ୍ ମୂଳଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଛେଳିମାଂସର ଅଧିକ ଋହିତା ଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛେଳି ପାଳନ ଆମ୍ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ସରଳ ଉପାୟ । ଛେଳିର ଗୁହାଳ ତିଆରି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଏମାନେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ।

ଛେଳିର କିସମ

ଆମ ଦେଶରେ କୋଡିଏ କିସମର ଛେଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାଂସ ପାଇଁ, କେତେକ ଉତ୍ତମ ମାଂସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପାଇଁ ଓ କେତେକ ଲୋମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି କିସମର ଛେଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଯଥା- ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଘୁମୁସରୀ । ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳି

ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜାତି । ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି,

ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।

ବିଶେଷତ୍ୱ

ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାଦାମୀ, କଳା, କସରା ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗର । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଶରୀର, ତେଜୀ ଆକୃତି, ଶିଙ୍ଗ ଲମ୍ବା ଓ ପଛ ଆଡ଼କୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଓ ବୋଦାର ଦାଢ଼ି ଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟମ ଦୁଗ୍ଧ (ଦୈନିକ ୨୫୦-୩୦୦ ଗ୍ରାମ) ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଂସ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ବୟସ୍କ ଛେଳିର ଓଜନ ୧୮ରୁ ୨୨ କି.ଗ୍ରା. ହୋଇଥାଏ । ମାଈ ଛେଳି ୧୧ମାସରେ ଥରେ ଓ ଥରକୁ ହାରାହାରି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ।

ବାସଗୃହ

ଆମ ଜଳବାୟୁରେ ବାସଗୃହର ଲମ୍ବ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେବା ଉଚିତ । ବୟସ୍କ ମାଈ ଛେଳି ପିଛା ୧୨ ବର୍ଗ ଫୁଟ ବୋଦା ପିଛା ୩୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଓ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଚଟାଣ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ । ଘରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବାଉଁଶ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରି ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲାରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଘରର ଛାତ ଆଜବେଷ୍ଟସ କିମ୍ବା ଟିଣ ଅପେକ୍ଷା ଚାଳ ଛପର ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଘର ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ ।

ଛେଳିର ଖାଦ୍ୟ

ପାଖ ଅ ଲରେ ମିଳୁଥିବା ବର, ଅଶ୍ୱତଥ, ସୁବାବୁଲ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବିଲାତିକଇଁଆ, ମହାନିମ୍ବ, ତେନ୍ତୁଳି, ବରକୋଳି, କଟେ ଲକୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ଗଛର ପତ୍ର ଛେଳି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ । ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛେଳି ରଖିଲେ ବର୍ଷାଦିନେ ବରଗୁଡ଼ି, ମକା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ବରସିମ୍ ଘାସଚାଷ କରି ଛେଳିକୁ ଦିଆଯାଏ । ଘାସ ଓ ଡାଳପତ୍ରର ଅଭାବ ସମୟରେ ଛେଳିକୁ ଦାନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥି ନିମନ୍ତେ ୫୦ ଭାଗ ମକା, ୨୦ ଭାଗ ଚିନାବାଦାମ୍ ପିଡ଼ିଆ, ୨୦ ଭାଗ କୁଣ୍ଡା, ୭ ଭାଗ ଗୁଡ଼, ୨ ଭାଗ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ୧ ଭାଗ ଖାଇବା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଏକ ସୁଷମ ଛେଳି ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଛେଳିର ପ୍ରଜନନ

ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଛେଳି ଗରମ ଆସନ୍ତି । ଏମାନେ ୨ ଦିନ ଗରମରେ ରହନ୍ତି ଓ ଗର୍ଭ ନ ରହିଲେ ୧୯ ରୁ ୨୧ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗରମ ଆସନ୍ତି । ପ୍ରତି ୨୦ ଟି ମାଈ ଛେଳି ପିଛା ଗୋଟିଏ ବୋଦା ଗୋଠରେ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତି ୨ ବର୍ଷରେ ବୋଦା ବଦଳ ହେବା ଓ କମ୍ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାଥିବା ୧୦ ଭାଗ ଛେଳି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଛେଳିମାନଙ୍କ ରୋଗ

ବାକ୍ଟେରିଆଲ ରୋଗ (Bacterial Diseases)

ଏ । ରୋ ଟକ୍ସିମିଆ (Enterotoxaemia)

ଏହି ରୋଗରେ ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁହାର ୫୦% ରୁ ୬୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ । ଏହା ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଶି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଏବେ । ରୋ ଟକ୍ସିମିଆ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ୍ ।